1 . PTX[Day1, 8, 15]+CBDCA

インターバル:4週 総コース数:4~6コース

| 薬剤名     | 投与量                         | 1 | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8             | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---------|-----------------------------|---|-----|-----|----|---|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| パクリタキセル | 70mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |   |     |     |    |   |    |    | $\overline{}$ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | AUC=6                       |   |     |     |    |   |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与量                        | m | g/b | 000 | dy | = | Αl | JC | ×             | (G | FF | +  | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

2 . VNR+CDDP《入院》

インターバル:3~4週 総コース数:4~6コース

| 薬剤名    | 投与量                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| ビノレルビン | 25mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> | / |   |   |   |   |   |   | $\mathbb{Z}$ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| シスプラチン | 80mg/ <b>m</b> i            |   |   |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

3 . VNR+CBDCA

インターバル:3週 総コース数:6コース

| 薬剤名     | 投与量                         | 1 | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|-----------------------------|---|-----|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ビノレルビン  | 25mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |   |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | <u>AUC=5</u>                |   |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与量                        | m | g/l | 000 | dy | = | Αl | JC | × | (G | FF | ₹+ | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |

4 . VNR

インターバル:3週 総コース数:規定なし

| 薬剤名    | 投与量                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ビノレルビン | 25mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

5 . GEM+CBDCA

インターバル:3~4週 総コース数:4~6コース

| 薬剤名     | 投与量                   | 1 | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|-----------------------|---|-----|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ゲムシタビン  | 1000mg/m <sup>2</sup> |   |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | <u>AUC=5</u>          |   |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与量                  | m | g/k | 000 | yk | = | Αl | JC | × | (G | FF | +  | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |

6 . GEM

インターバル:4週 総コース数:規定なし

|        |                       |   |   |   |   |   |   |   | • - | •  |    |    | •  |    | _  |    |    |    |    |    | _  |    |    |    |    |    |    | _  |
|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 薬剤名    | 投与量 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m <sup>2</sup> |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

7 DTX

インターバル:3週

総コース数:規定なし

|   | 薬剤名    | 投与量                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Г | ドセタキセル | 60mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

8 . VP-16+CBDCA

インターバル:3~4週 総コース数:4コース

| 薬剤名     | 投与量                  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|----------------------|----|-----|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| カルボプラチン | <u>AUC=5</u>         |    |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与量                 | mį | g/k | 000 | ly | = | Αl | JC | × | (G | FR | ₹+ | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| エトポシド   | 100mg/m <sup>2</sup> |    |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

インターバル:4週 総コース数:規定なし

| 薬剤名    | 投与量               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| イリノテカン | 100mg/ <b>m</b> ² |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

10 . PTX[Day1, 8, 15]+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

| 薬剤名     | 投与量                          | 1 | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8             | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|------------------------------|---|-----|-----|----|---|----|----|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| パクリタキセル | 100mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |   |     |     |    |   |    |    | $\overline{}$ |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | AUC=6                        |   |     |     |    |   |    |    |               |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与量                         | m | g/k | 000 | yk | = | Αl | JC | ×             | (G | iFF | ₹+ | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |

11 . PEM

インターバル:4週 総コース数:規定なし

| 薬剤名     | 投与量                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|---------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| ペメトレキセド | $500 \text{mg/m}^2$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

12. レジメン削除

13 . AMR

インターバル:3週

総コース数:規定なし

| 薬剤名    | 投与量                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アムルビシン | 35~45mg/m <sup>2</sup> | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

14 . PEM+CDDP+B-mab 《入院》

インターバル:3週

総コース数:4コース

|   | 薬剤名     | 投与量                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | ペメトレキセド | $500 \text{mg/m}^2$         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | シスプラチン  | 75mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ſ | ベバシズマブ  | 15mg/kg                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

15 . PEM+CBDCA+B-mab

インターバル:3週 総コース数:4コース

| 薬剤名     | 投与量                 | 1             | 2   | 3  | 4  | 5 | 6   | 7 | 8   | 9  | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|---------------------|---------------|-----|----|----|---|-----|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ペメトレキセド | $500 \text{mg/m}^2$ | $\overline{}$ |     |    |    |   |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | AUC=5~6             | /             |     |    |    |   |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与틟                | ₽n            | ng/ | Ъо | dy | = | · A | U | ) × | (( | βF | R+ | - 2 | 5) |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ベバシズマブ  | 15mg/kg             |               |     |    |    |   |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

16 . PEM+B-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

|         |                     |   |   |   |   |   |   |   |   | • • | _  |    |    | •  |    | _  |    |    |    |    |    |    |
|---------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 薬剤名     | 投与量                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ペメトレキセド | $500 \text{mg/m}^2$ |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ベバシズマブ  | 15mg/kg             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

17 . VP-16+CDDP+照射 《入院》

インターバル:4週(※照射後は3~4週)

総コース数:4コース

| 薬剤名    | 投与量                          | 1 | 2             | 3             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------|------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| エトポシド  | 100mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |   | $\overline{}$ | $\overline{}$ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン | 80mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>  |   |               |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

【照射】【1コース目のみ】

•通常、化学療法Day2より1.5Gy×2回/日、5回/週、総量45Gy

インターバル:1週 総コース数:規定なし

| 薬剤名         | 投与量               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| nab-パクリタキセル | 100mg/ <b>m</b> i |   |   |   |   |   |   |   |

### 19 . nab-PTX+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:規定なし

| 薬剤名         | 投与量                 | 1 | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8             | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-------------|---------------------|---|-----|-----|----|---|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| nab-パクリタキセル | $100 \text{mg/m}^2$ |   |     |     |    |   |    |    | $\overline{}$ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン     | AUC=6               |   |     |     |    |   |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             | ⇒投与量                | m | g/k | 000 | yk | = | Αl | JC | ×             | (G | FF | +  | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 20 . B-mab【メンテナンス用】

インターバル:3週 総コース数:規定なし

| 薬剤名    | 投与量     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| ベバシズマフ | 15mg/kg |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

### 21 . S-1+CBDCA

インターバル:3週 総コース数:3~6コース

|  |                 |   |             |   |   |   |   |   |             |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -  |    |    |
|--|-----------------|---|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 薬剤名  | 投与量             | 1 | 2           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9             | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| カルボプラチン  | AUC=5           |   |             |   |   |   |   |   |             |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ガルバフラチン AUC=5 /  |                 |   |             |   |   |   |   |   |             |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ⇒投与量mg/body = AUC×(GFR+25) TS-1(内服) 80mg/m <sup>i</sup> <sup>朝</sup> |                 |   |             |   |   |   |   |   |             |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 <sup>-</sup> 1(以及)  | ouring/111<br>夕 |   | $\setminus$ |   |   |   |   |   | $\setminus$ | $\overline{}$ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 22 . NGT

インターバル:3週 総コース数:規定なし

| 薬剤名   | 投与量                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ノギテカン | 1mg/m <sup>2</sup> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 23 . GEM+CDDP 《入院》

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

| 薬剤名    | 投与量                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ゲムシタビン | 1000mg/ <b>m</b> ² |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン | 80mg/ <b>m</b> ²   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

#### 24 . B-mab+Erlotinib

インターバル:3週

総コース数:規定なし

| 薬剤名        | 投与量        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ベバシズマブ     | 15mg/kg    | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| エルロチニブ(内服) | 150mg/body | / |   |   | / |   | / |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | /  |    |

## 25 . PTX+CBDCA+照射

インターバル:54日以上

総コース数:1コース

|         |                     |    |     |     |    |   |    |    | •           | •    |    |         |               |     |    |         |    | 1.0     |
|---------|---------------------|----|-----|-----|----|---|----|----|-------------|------|----|---------|---------------|-----|----|---------|----|---------|
| 薬剤名     | 投与量                 | 1  | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7  | 8           | :    | 15 | • • • • | 22            | ••• | 29 | • • • • | 36 | • • • • |
| パクリタキセル | 40mg/m <sup>2</sup> |    |     |     |    |   |    |    | $\setminus$ |      |    |         | $\overline{}$ |     |    |         |    |         |
| カルボプラチン | AUC=2               |    |     |     |    |   |    |    | $\setminus$ |      |    |         | $\setminus$   |     |    |         |    |         |
|         | ⇒投与量                | mį | g/k | 000 | dy | = | Αl | JC | ×           | (GFF | ₹+ | 25)     |               |     |    |         |    |         |

### 【照射】

- ・通常化学療法Day1より2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- •最終照射終了後、2週間以上休薬

インターバル:4週

総コース数:4コース

|   | 薬剤名    | 投与量                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|--------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | イリノテカン | 60mg/ <b>m</b> i            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Г | シスプラチン | 60mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# 27 .PTX[Day1,8]+CBDCA+B-mab

インターバル: 3週 総コース数: 最大6コース、B-mabはPDまで使用可

| 薬剤名     | 投与量               | 1  | 2   | 3  | 4  | 5 | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11             | 12  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|-------------------|----|-----|----|----|---|-----|----|-----|----|-----|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| パクリタキセル | 100mg/ <b>m</b> i |    |     |    |    |   |     |    |     |    |     |                |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | AUC=4~6           |    |     |    |    |   |     |    |     |    |     |                |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与틟              | ₫n | ng/ | Ъо | dy | = | · A | UC | ) × | (( | βFI | <del>7  </del> | - 2 | 5) |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ベバシズマブ  | 15mg/kg           |    |     |    |    |   |     |    |     |    |     |                |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 28 . S-1+CDDP+照射 《入院》

インターバル:4週(※照射後は3~4週)

総コース数:4~6コース

| 薬剤名      | 投与量                     | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12            | 13 | 14          | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|-------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| シスプラチン   | 60mg/ <b>m</b> i        | $\overline{}$ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |               |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TS-1(内服) | 00mg/m² 朝               |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |               |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          | 80mg/m <sup>***</sup> タ |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | $\overline{}$ |    | $\setminus$ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 【照射】

- ・通常、化学療法Day2より2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・最終照射終了後、2週間あけてから化学療法の3コース目を開始すん

# 29 . PEM+CDDP 《入院》

インターバル:3~4週

総コース数:4コース

| 薬剤名     | 投与量                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ペメトレキセド | $500 \text{mg/m}^2$         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン  | 75mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

#### 30 . VP-16+CBDCA+照射

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

| 薬剤名     | 投与量                          | 1  | 2   | 3  | 4   | 5 | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|------------------------------|----|-----|----|-----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| カルボプラチン | <u>AUC=5∼6</u>               |    |     |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ⇒投与量                         | mį | g/b | od | у : |   | Αl | JC | × | (G | FF | ₹+ | 25 | )  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| エトポシド   | 100mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> |    |     |    |     |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 【照射】

・通常化学療法Day2より2Gy/回、5回/週、総量45Gy

#### 31 Nivolumab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

| 薬剤名   | 投与量        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ニボルマブ | 240mg/body |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

### 32 . DTX+Ramucirumab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

|   | 薬剤名    | 投与量              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|--------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | ラムシルマブ | 10mg/kg          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ſ | ドセタキセル | 60mg/ <b>m</b> ² | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

インターバル:3週 総コース数:規定なし

| 薬剤名      | 投与量        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | / |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 34 . Atezolizumab

インターバル:3週 総コース数:規定なし

| 薬剤名     | 投与量         | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | $\overline{}$ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 35 , Low dose CBDCA十照射

インターバル:4週

総コース数:1コース

| 薬剤名     | 投与量              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| カルボプラチン | 30mg/ <b>m</b> i |   | / | / | / | / |   |   | / | / |    | /  | /  |    |    |    |    | /  | /  |    |    |    | /  |    | /  |    |    |    |    |

### 【照射】

- ·通常、2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・照射20回目までパラプラチン投与日に照射、

### 36 . Durvalumab

インターバル:2週 総コース数:24コース(12ヶ月)

(最大投与期間は12ヶ月で回数に変動あるため、総コース数はレジメン上24コースにしている)

|   | 薬剤名     | 投与量     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ĺ | デュルバルマブ | 10mg/kg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |