### 大腸レジメン

### 1 . IRIS療法

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	125mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>																												
TS-1(内服)	朝 80mg/ <b>㎡</b>		$\setminus$	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$	$\setminus$	$\setminus$	$\overline{}$																			
עותניק) ו־טו	ouring/111 夕	/		/	/	/	/		/	/				/															

2 .CPT-11(A法)【 4W · 5W 】

インターバル:5週(Day 1、8、15の時は4週)

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3 14	15	16	3 1	7 1	8 1	9 2	20 2	21	22	23	24	25	26	3	7 2	8	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>																																					$\prod$

3 . CPT-11(B法)

インターバル:5週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	150mg/ <b>m</b> i	/																																		

- 4 レジメン削除
- 5 . FL療法

インターバル:8週

総コース数:規定なし

術後補助⇒3コース

薬剤名	投与量	1	2	• • • •	7	8	9	• • • •	14	15	16	• • • •	21	22 2	3	- :	28	29	30	•••	35	36	37	• • • •	56
レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>									$\overline{}$															
5-FU	500mg/m <sup>2</sup>																	$\overline{\ \ }$							

- 6 レジメン削除
- 7 . mFOLFOX6療法(リザーバー)

インターバル:2週総コース数:進行再発⇒規定なし

術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$														
オキサリプラチン	85mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	$\overline{}$													
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$2400 \text{mg}/\text{m}^2$														

8 . mFOLFOX6療法(末梢)《入院》

インターバル:2週総コース数:進行再発⇒規定なし

術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$	$\setminus$													
オキサリプラチン	85mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	$\overline{}$													
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	$\overline{}$													
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>														

### 9 . mFOLFOX6療法+B-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

										•				•	
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	5mg/kg														
レボホリナート	$200 \text{mg}/\text{m}^{\!\!\!\!\!2}$	$\setminus$													
オキサリプラチン	$85 \text{mg/m}^2$														
5-FU	$400 \text{mg/m}^2$	$\overline{}$													
5-FU	$2400 \text{mg}/\text{m}^{2}$														

### 10 . mFOLFOX6療法+B-mab(末梢)《入院》

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	5mg/kg														
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>														
オキサリプラチン	85mg/ <b>m</b> i														
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>														

## 11 . mFOLFOX6療法+C-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	/							/						
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$														
オキサリプラチン	85mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>														
5-FU	$400 \text{mg/m}^2$														
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>														

# 12 . mFOLFOX6療法+P-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	$\setminus$													
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$	$\overline{}$													
オキサリプラチン	85mg/ <b>m</b> i														
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	/													
5-FU	$2400 \text{mg}/\text{m}^2$	/													

#### 13 . FOLFIRI療法(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$														
イリノテカン	150~180mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$400 \text{mg/m}^2$														
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>														

# 14 . FOLFIRI療法(末梢)《入院》

インターバル:2週

															,,,		~
薬剤	<u> </u>	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
レボホリカ	トート	$200 \text{mg/m}^2$															
イリノテ:	カン	150~180mg/m <sup>2</sup>															
5-FL	J	400mg/m <sup>2</sup>															l
5-FL	J	2400mg/m <sup>2</sup>															

### 15 . FOLFIRI療法+B-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

										•				•	
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	5mg/kg	$\overline{}$													
レボホリナート	$200 \text{mg}/\text{m}^2$	$\setminus$													
イリノテカン	150~180mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$400 \text{mg/m}^2$	$\overline{}$													
5-FU	$2400 \text{mg}/\text{m}^{2}$														

### 16 . FOLFIRI療法+B-mab(末梢)《入院》

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	5mg/kg	$\overline{}$													
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>														
イリノテカン	150~180mg/m <sup>2</sup>	/													
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$2400 \text{mg}/\text{m}^2$														

### 17 . FOLFIRI療法+C-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>								//						
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$														
イリノテカン	150~180mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$400 \text{mg/m}^2$														
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>		/												

# 18 . FOLFIRI療法+P-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	$\setminus$													
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$	$\overline{}$													
イリノテカン	150~180mg/m <sup>2</sup>	$\overline{}$													
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$2400 \text{mg}/\text{m}^2$														

#### 19 . FOLFIRI療法+P-mab(末梢)《入院》

インターバル:2週

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg														
レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$														
イリノテカン	150~180mg/m <sup>2</sup>														
5-FU	$400 \text{mg/m}^2$	$\overline{}$													
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	\													

インターバル:3週

総コース数:規定なし

術後補助⇒3ヶ月間(※)または6ヶ月間

※再発低リスクの場合

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/ <b>m</b> i																					
カペシタビン(内服)	朝 2000mg/m³		$\setminus$	$\setminus$					$\setminus$													
アンテロン(内服)	2000mg/m 夕	7																				

#### 21 . XELOX療法+B-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	$\overline{}$																				
カペシタビン(内服)	朝 2000mg/m³								$\setminus$		$\setminus$											
カペンダニン (内加)	2000ilig/ III タ																					

#### 22 , FL療法+B-mab

インターバル:8週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2 .	• • •	7	8	9	 14	15	16	• • • •	21	22	23	•••	28	29	30	•••	35	36	37	•••	42	43	44	• • •	56
ベバシズマブ	5mg/kg																											
レボホリナート	$250 \text{mg/m}^2$																											
5-FU	$500 \text{mg/m}^2$																											

### 23 . IRIS療法+B-mab

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ	5mg/kg															$\setminus$													
イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>															$\setminus$													
TS-1(内服)	朝 80mg/ <b>m</b> ẩ				$\overline{}$	$\setminus$					$\setminus$	$\overline{}$	$\overline{}$			$\setminus$													
13-1(内別以)	夕   夕																												

#### 24 . CPT-11+C-mab

インターバル:7週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	• • •	7	8	9	•••	14	15	16	• • • •	21	22	23	•••	28	29	30	 35	5 3	6 37	 •	42	43	44	 49
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>²</sup>																					/					
セノヤンマン	2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	/				/				/				/					Ш								
イリノテカン	150mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>																										

#### 25 . CPT-11+P-mab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	パニツムマブ	6mg/kg	$\overline{}$													
ĺ	イリノテカン	150mg/ <b>m</b> i	/													

#### 26 . C-mab

インターバル:1退

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
カツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup>							
	2回目以降250mg/m							

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg														

### 28 . SOX療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>																					
TS-1(内服)	朝 80mg/ <b>㎡</b>		$\setminus$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$						$\overline{}$			$\overline{}$							
13-1 (PINK)	oung/III 夕	$\setminus$	$\setminus$	$\setminus$	$\setminus$	$\setminus$						$\setminus$	$\setminus$		$\setminus$							

### 29 . XELOX療法+P-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パニツムマブ	6mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>																					
カペシタビン(内服)	朝 2000mg/m <sup>2</sup>				/																	
ガベンダビン(内加)	2000ilig/111 夕	$\overline{\ \ }$																				

#### 30 . IRIS療法+P-mab

インターバル:4週

総コース数:規定なし

										-				• •		-					- 1								
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パニツムマブ	6mg/kg																												
イリノテカン	125mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>																												
TS-1(内服)	朝 80mg/㎡																												
(אותניק) ו טו	夕 夕																												

### 31 . SOX療法+P-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パニツムマブ	6mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>																					
TS-1(内服)	朝 80mg/ <b>m</b> ẩ																					
13-1(内)((大)	夕 夕	$\overline{Z}$		/	/					/												

#### 32 . SOX療法+B-mab

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg	$\overline{}$																				
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	/																				
て5-1(内服)	朝 80mg/ <b>m</b> ẩ																					
TS-1(内服)	夕																					

#### 33 . Capecitabine+B-mab

インターバル:3週

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg																					
カペシタビン(内服)	朝 2000mg/m³		$\setminus$	$\overline{}$		$\setminus$		$\setminus$					$\setminus$									
カ・マメニン (内加)	2000ilig/111 タ																					

インターバル:6週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	• • •	41	42
ベバシズマブ	5mg/kg															$\setminus$																		
TS-1(内服)	朝 80mg/㎡								$\overline{}$			$\setminus$		$\setminus$	$\setminus$	$\setminus$													$\overline{}$					
	- A	$\overline{Z}$													/																			

#### 35 . TAS-102+B-mab

インターバル:4週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ	5mg/kg																												
ロンサーフ(内服)	朝 70mg/m2																												
	70mg/m2 タ																												

# 36 . XELIRI療法+B-mab

インターバル:3週

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg																					
イリノテカン	$200 \text{mg}/\text{m}^{\!3}$																					
カペシタビン(内服)	朝 1600mg/mੈ		$\setminus$																			
カペンダビン (内加)	7000mg/m 夕	/																				