血液内科 CLLレジメン

1 . FC療法

インターバル：4週　　総コース数：6コース

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルダラビン | 25mg/㎡ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シクロホスファミド | 250mg/㎡ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 . レジメン削除

3 . Alemtuzumab

総コース数：投与開始から12週間

1コース目　　インターバル：1日

| 薬剤名 | 投与量 | 1 |
|---|---|---|
| アレムツズマブ | 3mg/body | ／ |

2～8コース目　　インターバル：1日

| 薬剤名 | 投与量 | 1 |
|---|---|---|
| アレムツズマブ | 10mg/body | ／ |

9コース目以降　　インターバル：1週

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレムツズマブ | 30mg/body | ／ | | ／ | | ／ | | |

4 . Bendamustine

インターバル：4週　　総コース数：最大6コースまで

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンダムスチン | 100mg/㎡ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 . Bendamustine

インターバル：4週　　総コース数：最大6コースまで

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リツキシマブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （1コース目） | 375mg/㎡ | | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2～6コース目） | 500mg/㎡ | | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンダムスチン | 70mg/㎡ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 . VenR療法

インターバル：4週　　総コース数：最大6コースまで

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベネトクラクス（内服） | 400mg | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| リツキシマブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （1コース目） | 375mg/㎡ | | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2～6コース目） | 500mg/㎡ | | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |