

大腸レジメン

1 . IRIS療法

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イリノテカン	125mg/m ²	■														■														
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

2 . CPT-11(A法)【 4W ・ 5W 】

インターバル:5週(Day 1、8、15の時は4週)

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
イリノテカン	100mg/m ²	■							■							■								■															

3 . CPT-11(B法)

インターバル:5週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
イリノテカン	150mg/m ²	■														■																							

4 . レジメン削除

5 . FL療法

インターバル:8週

総コース数:規定なし
術後補助⇒3コース

薬剤名	投与量	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	28	29	30	...	35	36	37	...	56														
レボホリナート	250mg/m ²	■				■				■				■				■				■																	
5-FU	500mg/m ²	■				■				■				■				■				■																	

6 . レジメン削除

7 . mFOLFOX6療法(リザーバー)

インターバル:2週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/m ²	■													
オキサリプラチン	85mg/m ²	■													
5-FU	400mg/m ²	■													
5-FU	2400mg/m ²	■													

8 . mFOLFOX6療法(末梢)《入院》

インターバル:2週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/m ²	■													
オキサリプラチン	85mg/m ²	■													
5-FU	400mg/m ²	■													
5-FU	2400mg/m ²	■													

9 . レジメン削除

10 . レジメン削除

11 . mFOLFOX6療法+C-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

