

5 . DeVIC療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■																			
エトポシド	100mg/m ²	■	■	■																			
イホスファミド	1500mg/m ²	■	■	■																			
メスナ	300mg/m ² /回×3	■	■	■																			
カルボプラチン	300mg/m ²	■																					

6 . ABVd療法

インターバル:4週

総コース数:最大8コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビンブラスチン※1	6mg/m ²	■														■													
ドキソルビシン	25mg/m ²	■														■													
ブレオマイシン※2	9mg/m ²	■														■													
ダカルバジン	250mg/m ²	■														■													
※1ビンブラスチンの上限は10mg																													
※2ブレオマイシンの上限は15mg																													

7 . GDP療法【Modify】(変法有り)

インターバル:3~4週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■	■																								
ゲムシタビン	1000mg/m ²	■							■																				
シスプラチン	75mg/m ²	■																											

8 . GEM

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン	1000mg/m ²	■							■							■													

9 . 大量MTX + LV救援療法

インターバル:2週以上

総コース数:原則3コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メトレキサート※	3000~3500mg/m ²	■													
※65歳以上の患者では1000mg/m ² に減量															

10 . Brentuximab Vedotin

インターバル:3週

総コース数:最大16コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

11 . CPT-11(C法)【 4W ・ 5W 】

インターバル:5週(day1.2.3.8.9.10投与の場合は4週)

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
イリノテカン	40mg/m ²	■	■	■					■	■	■					■	■	■																					

12 . Modified R-CODOX-M/IVAC療法(R-CODOX-M)

インターバル:規定なし

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
シクロホスファミド	800mg/m ²	■																					
	200mg/m ²		■	■	■	■																	
ビンクリスチン※1	1.5mg/m ²	■							■								■						
ドキシソルビシン	40mg/m ²	■																					
メトレキサート	536mg/m ²									■													
メトレキサート	2461mg/m ²										■												
ロイコボリン	85.7mg/m ²											■											
ロイコボリン※2	12mg/m ²												■	■	■	■	■						
シタラビン(髄注)※3	40mg/body	■																					
プレドニゾン(髄注)※3	20mg/body	■																					
メトレキサート(髄注)※3	15mg/body																■						
プレドニゾン(髄注)※3	10mg/body																■						
リツキシマブ※4	375mg/m ²									■													

※1 オンコビンの上限は2mg、Day15は1コース目は実施せず、2コース目で神経障害が無ければ実施□
 ※2 ロイコボリンの12mg/m²はMTX血中濃度が5×10⁻⁸M未満になるまで投与
 ※3 初診時に中枢神経浸潤を認めた症例では1コース目にDay 5 (Ara-C)、Day 17(MTX)を追加。2コース目は実施しない。□
 ※4 リツキシマブ不要の場合は除く

13 . Modified R-CODOX-M/IVAC療法 (R-IVAC)

インターバル:規定なし

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イホスファミド	1500mg/m ²	■	■	■	■	■									
メスナ	300mg/m ²	■	■	■	■	■									
エトポシド	60mg/m ²	■	■	■	■	■									
キロサイド	2000mg/m ²	■	■	■	■	■									
	2000mg/m ²	■	■	■	■	■									
シタラビン(髄注)※1	40mg/body							■		■					
プレドニゾン(髄注)※1	20mg/body							■		■					
メトレキサート(髄注)	15mg/body					■									
プレドニゾン(髄注)	10mg/body					■									
リツキシマブ※2	375mg/m ²							■							

※1 初診時に中枢神経浸潤を認めた症例では、1コース目に追加。2コース目は実施しない。□
 ※2 リツキシマブ不要の場合は除く□

14 . CHASE療法

インターバル:3週

総コース数:最大4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■																		
シクロホスファミド	1200mg/m ²	■																				
シタラビン	2000mg/m ²	■																				
エトポシド	100mg/m ²	■																				

15 . A+AVD療法

インターバル:4週

総コース数:最大6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
プレツキシマブ ベドチン	1.2mg/kg	■														■													
ドキシソルビシン	25mg/m ²	■														■													
ビンブラスチン※1	6mg/m ²	■														■													
ダカルバジン	375mg/m ²	■														■													

※1 エクザールの上限は10mg

リツキサン	375mg/m ²																												
メソトレキセート(髄注)	15mg/body																												
プレドニン(内服)	60mg/m ²																												
※オンコビンの上限は0.5mg/日																													

23 Romidepsin

インターバル:4週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イストダックス	14mg/m ²																													

24 GB療法【1コース目】

インターバル:4週 総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ガザイバ	1000mg/body																													
トレアキシシ	90mg/m ²																													

25 GB療法【2コース目以降】

インターバル:4週 総コース数:6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ガザイバ	1000mg/body																													
トレアキシシ	90mg/m ²																													

26 R-CHOP療法【1日療法】【2コース目以降】

インターバル:3週 総コース数:8コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキサン	375mg/m ²																						
オンコビン※	1.4mg/m ²																						
アドリアシン	50mg/m ²																						
エンドキサン	750mg/m ²																						
プレドニン(内服)	60mg/m ²																						
※オンコビンの上限は2mg																							

27 Rituximab【90分間投与】【2コース目以降】

インターバル:1週 総コース数:8コースまで
維持療法⇒8週 維持療法⇒12コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
リツキサン	375mg/m ²							

28 RB療法【RIT90分間投与】【2コース目以降】

インターバル:4週 総コース数:最大6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
リツキサン	375mg/m ²																													
トレアキシシ	90mg/m ²																													

29 R-square療法【1コース目】

インターバル:4週 総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
リツキサン	375mg/m ²																													
レブラミド(内服)	20mg/body																													

30 R-square療法【2コース目以降】

インターバル:4週 総コース数:4コース

2~5コース目

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

リツキサン	375mg/m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
レブラミド(内服)	20mg/body	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

インターバル: 4週

総コース数: 7コース

6~12コース目

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
レブラミド(内服)	20mg/body	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

31 G-CHOP療法【1コース目】

インターバル: 3週

総コース数: 1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ガザイバ	1000mg/body	1							8							15						
オンコビン※	1.4mg/m ²	1																				
アドリアシン	50mg/m ²	1																				
エンドキサン	750mg/m ²	1																				
水溶性プレドニン	100mg/body	1																				
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	1	2	3	4	5																

※オンコビンの上限は2mg

32 G-CHOP療法【2~6コース目】

インターバル: 3週

総コース数: 5コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ガザイバ	1000mg/body	1																				
オンコビン※	1.4mg/m ²	1																				
アドリアシン	50mg/m ²	1																				
エンドキサン	750mg/m ²	1																				
水溶性プレドニン	100mg/body	1																				
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	1	2	3	4	5																

※オンコビンの上限は2mg

33 G-CHOP療法【7、8コース目】

インターバル: 3週

総コース数: 2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ガザイバ	1000mg/body	1																				

34 G-CVP療法【1コース目】

インターバル: 3週

総コース数: 1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ガザイバ	1000mg/body	1							8							15						
オンコビン※	1.4mg/m ²	1																				
エンドキサン	750mg/m ²	1																				
水溶性プレドニン	100mg/body	1																				
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	1	2	3	4	5																

※オンコビンの上限は2mg

35 G-CVP療法【2~8コース目】

インターバル: 3週

総コース数: 7コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ガザイバ	1000mg/body	1																				
オンコビン※	1.4mg/m ²	1																				
エンドキサン	750mg/m ²	1																				
水溶性プレドニン	100mg/body	1																				
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	1	2	3	4	5																

※オンコビンの上限は2mg

36 Pola-BR療法【1コース目】

インターバル:3週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキサン	375mg/m ²	■	■																			
トレアキシン	90mg/m ²	■	■																			
ポライビー	1.8mg/kg		■																			

37 Pola-BR療法【2～6コース目】

インターバル:3週

総コース数:5コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキサン	375mg/m ²	■																				
トレアキシン	90mg/m ²	■																				
ポライビー	1.8mg/kg		■																			

38 Pola+R-CHP療法【1コース目】

インターバル:3週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキサン	375mg/m ²	■																				
ポライビー	1.8mg/kg		■																			
アドリアシン	50mg/m ²	■																				
エンドキサン	750mg/m ²	■																				
水溶性プレドニン	100mg/body	■																				
プレドニン(内服)※1	60mg/m ²		■	■	■	■																

※1 プレドニン(内服)の上限は100mg/日

39 Pola+R-CHP療法【2～6コース目】

インターバル:3週

総コース数:5コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキサン	375mg/m ²	■																				
ポライビー	1.8mg/kg		■																			
アドリアシン	50mg/m ²	■																				
エンドキサン	750mg/m ²	■																				
水溶性プレドニン	100mg/body	■																				
プレドニン(内服)※1	60mg/m ²		■	■	■	■																

※1 プレドニン(内服)の上限は100mg/日

40 Pola+R-CHP療法【7～8コース目】

インターバル:3週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキサン	375mg/m ²	■																				

41 Nivolumab【2w】

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ	240mg/body	■													

42 Nivolumab【4w】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ	480mg/body	■																											

43 Pembrolizumab【3w】

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
キイトルーダ	200mg/body	/																					

44 Pembrolizumab【6w】

インターバル:6週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...	42	
キイトルーダ	400mg/body	/																							

45 Mogamulizumab

インターバル:1週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
ポテリジオ	1mg/kg	/						

46 VR-CAP療法【1コース目】

インターバル:3週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベルケイド	1.3mg/m ²	/		/				/			/												
リツキサン	375mg/m ²	/	/																				
アドリアシン	50mg/m ²	/																					
エンドキサン	750mg/m ²	/																					
水溶性プレドニン	100mg/body	/																					
プレドニン(内服)※	60mg/m ²		/	/	/	/																	

※ プレドニン(内服)の上限は100mg/日

47 VR-CAP療法【2コース目以降】

インターバル:3週

総コース数:6~8コース目まで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベルケイド	1.3mg/m ²	/		/				/			/												
リツキサン	375mg/m ²	/	/																				
アドリアシン	50mg/m ²	/																					
エンドキサン	750mg/m ²	/																					
水溶性プレドニン	100mg/body	/																					
プレドニン(内服)※	60mg/m ²		/	/	/	/																	

(6コース目に初めて奏効が認められた場合は最大8コース目まで投与可)

※ プレドニン(内服)の上限は100mg/日