1 . [BS]Rituximab

インターバル:1週

総コ	一ス	数	: 8	3	—	ス

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
リツキシマブ	375mg/ m i							

2 . CHOP療法

インターバル:2~3週 総コース数:3~8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビンクリスチン※	1.4mg/ m ²														
ドキソルビシン	50mg/ m ²														
シクロホスファミド	750mg/ m ²														
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²														
※ビンクリスチンの」	上限は2mg														

3 . THP-COP療法

【~69歳】

インターバル:2~4週

総コース数:3~8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビンクリスチン※	1.4mg/m ²														
ピラルビシン	50mg/ m ²														
シクロホスファミド	750mg/ m ²														
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²					\setminus									
※ビンクリスチンの」	上限は2mg														

【PS 0~3かつAlb 3.0g/dl以上で70~79歳】

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビンクリスチン※	1.0mg/ m ²														
ピラルビシン	40mg/m ²														
シクロホスファミド	650mg/ m ²														
プレドニゾロン(内服)	40mg/m ²														
※ビンクリスチンの」	上限は2mg														

【PS 0~3かつAlb 3.0g/dl以上で80歳~】

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビンクリスチン※	1.0mg/ m ²														
ピラルビシン	30mg/ m ²														
シクロホスファミド	400mg/m ²														
プレドニゾロン(内服)	30mg/ m ²														
※ビンクリスチンの」	上限は2mg														

4 Bendamustine

インターバル:3週 総コース数:最大8コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベンダムスチン	120mg/ m i	/																					

5 . DeVIC療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン(注)	33mg/body																					
エトポシド	100mg/ m i																					
イホスファミド	1500mg/m ²																					
メスナ	300mg/m ² /回×3																					
カルボプラチン	300mg/ m ²																					

6 . ABVd療法

インターバル:4週 総コース数:最大8コースまで

										•	_			•		_		•	L. —						-			_	
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビンブラスチン※1	6mg/m ²																												
ドキソルビシン	25mg/ m ²																												
ブレオマイシン※2	9mg/ m ²																												
ダカルバジン	$250 \text{mg/} \vec{m}$																												
※1ビンブラスチンの	上限は10r	ng																											

※2 ブレオマイシンの上限は15mg

7 . GDP療法【Modify】(変法有り)

インターバル:3~4週

総コース数:4~6コース

										•																			
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン(注)	33mg/body																												
ゲムシタビン	1000mg/ m i																												
シスプラチン	75mg/ m i																												

8 . GEM

インターバル:4週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン	1000mg/m ²																												

9 . 大量MTX + LV救援療法

インターバル:2週以上 総コース数:原則3コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メトトレキサート※	3000~3500mg/m ²														
※65歳以上の患者で	では1000mg	g/r	ท์ไ	こ派	龙量	1									

10 . Brentuximab Vedotin

インターバル:3週

総コース数:最大16コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg																					

11 . CPT-11(C法)【 4W · 5W 】

インターバル:5週(day1.2.3.8.9.10投与の場合は4週)

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0 1	1 1:	2 13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	40mg/ m ²									1	1																								

インターバル:規定なし

総コース数:2コース

								-			•	,,,	. />	ι ~	- 0							dan
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シクロホスファミド	800mg/ m i																					
ングロルスファミト	200mg/ m ²																					
ビンクリスチン※1	1.5mg/ m ²	$\overline{/}$							$\overline{\ }$							$\overline{\ \ }$						
ドキソルビシン	40mg/ m ²																					
メトトレキサート	536mg/ m ²																					
メトトレキサート	2461mg/m ²										$\overline{\ \ }$											
ホリナート	85.7mg/ m i																					
ホリナート※2	12mg/ m ²												/									
シタラビン(髄注)※3	40mg/body					7																
プレドニゾロン(髄注)※3	20mg/body					V																
メトトレキサート(髄注)※3	15mg/body																					
プレドニゾロン(髄注)※3	10mg/body																					
リツキシマブ※4	375mg/ m i									/												
	•													_			_				_	

※1 ビンクリスチンの上限は2mg、Day15は1コース目は実施せず、2コース目で神経障害が無ければ実施

※2 ホリナートの12mg/mはMTX血中濃度が5×10-8M未満になるまで投与

※3 初診時に中枢神経浸潤を認めた症例では1 コース目にDay 5 (Ara-C)、Day 17(MTX)を追加。2コース目は実施しない。

※4 リツキシマブ不要の場合は除く

13 . [BS]Modified R-CODOX-M/IVAC療法(R-IVAC)

インターバル:規定なし

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イホスファミド	1500mg/m ²														
メスナ	300mg/m^2														
エトポシド	60mg/ m ²														
シタラビン	2000mg/m ²														
ンダフレン	2000mg/m ²	/	$\overline{\ \ }$												
シタラビン(髄注)※1	40mg/body									\Box					
プレドニゾロン(髄注)※1	20mg/body									/					
メトトレキサート(髄注)	15mg/body														
プレドニゾロン(髄注)	10mg/body														
リツキシマブ※2	375mg/ m ⁴														
※1 初診時に中枢神経浸潤	を認めた症例で	では	, 1:	<u></u>	ス目	l(=)	追加	1。2:		スト	まは	実施	近した	ない	

※2 リツキシマブ不要の場合は除く

14. CHASE療法

インターバル:3週 総コース数:最大4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン(注)	33mg/body																					
シクロホスファミド	$1200 \text{mg}/\text{m}^{\!3}$																					
シタラビン	$2000 \text{mg}/\text{m}^{\!\!\!\!\!2}$																					
エトポシド	100mg/ m ²																					

15 . A+AVD療法

インターバル:4週 総コース数:最大6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ブレンツキシマブ ベドチン	1.2mg/kg																												
ドキソルビシン	25mg/ m ²																												
ビンブラスチン※1	6mg∕ m ²																												
ダカルバジン	375mg/ m i̇́	$\overline{/}$																											
※1 ビンブラスチンの) 上限け10	lmo	r																										

※1 ピンフラスチンの上限は10mg

16 . A+CHP療法

インターバル:3週 総コース数:最大8コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg																					
ドキソルビシン	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg/ m ²																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²																					

17 . [BS]RB療法

インターバル:4週 総コース数:6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リツキシマブ	375mg/m^2																												
ベンダムスチン	90mg/ m i																												

18 . Obinutuzumab 維持療法

インターバル:8週 総コース数:最大12コースまで

薬剤名	投与量	1	2	 56
オビヌツズマブ	1000mg/body			

19 . Pralatrexate

インターバル:7週 総コース数:規定なし

											_							
薬剤名	投与量	1	2	 7	8	9	 14	15	16	 21	22	23	28	29	30	 35	37	 49
プララトレキサート	30mg/ m ⁴													/				

20 .[BS]DA-EPOCH-R療法

インターバル:3週

総コース数:8コース

														•	, , ,	. •	<u>~</u>					
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドキソルビシン	10mg/ m ²																					
ビンクリスチン※	0.4mg/ m ²																					
エトポシド	50mg/ m i																					
シクロホスファミド	750mg/ m i																					
リツキシマブ	375mg/ m i																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²																					
※ビンクリスチン	ンの上限は0.	5m	ıg/	日																		

21 . DA-EPOCH療法

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドキソルビシン	10mg/ m i																					
ビンクリスチン※	0.4mg/ m ²																					
エトポシド	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg/ m ²																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m i																					Ш
※ビンクリスチン	ンの上限は0.	5m	g/	日																		

インターバル:3週

総コース数:4コース

														• •		. •	<u>~</u>					
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドキソルビシン	10mg/ m ²																					
ビンクリスチン※	0.4mg/ m ²																					
エトポシド	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg∕ m i̇́																					
リツキシマブ	375mg/ m ²																					
メトトレキサート(髄注)	15mg/body																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²																					
※ビンクリスチン	ンの上限は0.	5m	g/	日																		

23 . Romidepsin

												<u>イ:</u>	ング	7 —	バ	ル	: 4	週					á	総=	<u> </u>	-ス	数	<u>: </u>	記定	Eな	し
	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ĺ	ロミデプシン	14mg/ m i																													

24 . GB療法【1コース目】

											イ:	ング	7 —	·/Ň	ル	: 4	週						総	<u> </u>	<u>—;</u>	ス紫	女:	1コ	<u> </u>	ス
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
オビヌツズマブ	1000mg/body																													
ベンダムスチン	90mg∕ m i̇́																													

25 . GB療法【2コース目以降】

											イ:	ング	7 —	バ	ンル	: 4	週					総	<u>:</u>	<u> </u>	ス数	ኒ : 6	;⊐-	ーフ	くま	で
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	ì
オビヌツズマブ	1000mg/body																													ì
ベンダムスチン	90mg/ m ²																													ì

26 . [BS]R-CHOP療法【1日療法】【2コース目以降】

											<u>イ:</u>	ング	7 —	-/ヾ	ンレ	: 3	週					総	シュース数:8コースまで
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ	375mg/ m i̇́																						
ビンクリスチン※	1.4mg/ m ²																						
ドキソルビシン	50mg/ m ²																						
シクロホスファミド	750mg/ m i̇́																						
プレドニゾロン(内服)	60mg/m^2																						
※ビンクリスチン	ノの上限は2i	ng																					

27 . [BS]Rituximab【90分間投与】【2コース目以降】

インターバル:1週 総コース数:8コースまで 維持療法⇒8週 維持療法⇒12コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
リツキシマブ	375mg/ m ²							

28 . [BS]RB療法【RIT90分間投与】【2コース目以降】

											<u>イ:</u>	ンち	7 —	-/Ň	ル	: 4	週					総	<u> </u>	-ス	数:	最え	է 6=	<u></u>	スま	ミで
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
リツキシマブ	375mg/m ²																													
ベンダムスチン	90mg/ m i																													

29 . [BS]R-square療法【1コース目】

インターバル:4週

総コース数:1コース

													• •								446		•	. ~					
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リツキシマブ	375mg∕ m i̇́																												
レナリドミド(内服)	20mg/body					/			1	/			/	\overline{Z}	\overline{Z}					/									

30 . [BS]R-square療法【2コース目以降】

インターバル:4週

総コース数:4コース

2~5コース目

薬剤名	投与量	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リツキシマブ	375mg∕ m i̇́																											
レナリドミド(内服)	20mg/body							1				/				/				/								

インターバル:4週

総コース数:7コース

6~12コース目

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
レナリドミド(内服)	20mg/body																			/										

31 . G-CHOP療法【1コース目】

インターバル:3週

総コース数:1コース

												•	,,,	<u>. u</u>	<u></u>					네시다		
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オビヌツズマブ	1000mg/body																					
ビンクリスチン※	1.4mg/ m i̇́																					
ドキソルビシン	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg/ m ²																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m i																					
※ビンクリスチンの	D上限は2mg																					

32 . G-CHOP療法【2~6コース目】

インターバル:3週

総コース数:5コース

									` I -		_	, ,	1	. 0	<u> </u>					小心	_	
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オビヌツズマブ	1000mg/body																					
ビンクリスチン※	1.4mg/ m ²																					
ドキソルビシン	50mg/ m i																					
シクロホスファミド	750mg/ m ²																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m i																					
※ビンクリスチンの	D上限は2mg																					

33 . G-CHOP療法【7、8コース目】

インターバル:3週 総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
オビヌツズマブ	1000mg/body																						

34 . G-CVP療法【1コース目】

インターバル:3週 総コース数:1コース

															<i>,</i> ,	•						440
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オビヌツズマブ	1000mg/body																					
ビンクリスチン※	1.4mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg∕ m i̇́																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²																					
※オンコビンの		•																				

35 . G-CVP療法【2~8コース目】

インターバル:3调

総コース数:7コース

													~	<i>,</i> ,	<i>,</i> ,	. •	<u> </u>					4462
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オビヌツズマブ	1000mg/body																					
ビンクリスチン※	1.4mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg∕ m i̇́																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)	60mg/ m ²																					
※ビンクリスチ:	-	ng										-										

36 . [BS]Pola-BR療法【1コース目】

インターバル:3週

総コース数:1コース

																1						1110
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/ m i																					
ベンダムスチン	90mg/ m ²																					
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg																					

37 . [BS]Pola-BR療法【2~6コース目】

インターバル:3週

総コース数:5コース

															•							11.0
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/ m ²																					
ベンダムスチン	90mg/ m ²																					
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg																					

38 . [BS]Pola+R-CHP療法【1コース目】

インターバル:3调

総コース数:1コース

														•	<i>,</i>	. •	<u></u>					네시다
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg∕ m i̇́																					
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg																					
ドキソルビシン	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg∕ m i̇́																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)※1	60mg/ m ²																					
※1 プレドニゾロ	コン(内服)の.	上月	見に	<u>†</u> 10)Or	ng,	/ E	1														

39 . [BS]Pola+R-CHP療法【2~6コース目】

インターバル:3週 総コース数:5コース

														•	, -	. •	<u>~</u>					440.
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/ m i																					
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg																					
ドキソルビシン	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg/ m i																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニン(内服)※1	60mg/ m i																					
※1 プレドニゾロ	ロン(内服)の.	上队	艮に	<u>‡1</u> (00r	ng,	/E	1			-											

40 . [BS]Pola+R-CHP療法【7~8コース目】

インターバル:3週 総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/ m ²																					

41 . Nivolumab [2w]

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body														

42 . Nivolumab [4w]

_											<u>イ:</u>	ンク	7 —	<u>-バ</u>	ル	: 4	週				彩	<u> </u>	1—	<u>-ス</u>	数	:	見定	[な	<u>. L</u>	
	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	ニボルマブ	480mg/body	$\overline{\ \ }$																									П		

43 . Pembrolizumab [3w]

インターバル:3週	総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペムブロリズマブ	200mg/body																					

44 . Pembrolizumab [6w]

インターバル:6週	総コース数∶規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	 42
ペムブロリズマブ	400mg/body																						

45 . Mogamulizumab

インターバル:1週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
モガムリズマブ	1mg/kg							

46 . [BS]VR-CAP療法【1コース目】

インターバル:3週 総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/ m ²																					
リツキシマブ	375mg/ m ²																					
ドキソルビシン	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg/ m ²																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)※	60mg/ m ²																					
※ プレドニゾロ		限	は	100	0m	g/	日															

47 . [BS]VR-CAP療法【2コース目以降】

インターバル:3週 総コース数:6~8コース目まで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/ m ²																					
リツキシマブ	375mg/ m ²																					
ドキソルビシン	50mg/ m ²																					
シクロホスファミド	750mg/ m ²																					
プレドニゾロン(注)	100mg/body																					
プレドニゾロン(内服)※	60mg/ m ²																					
※プレドニゾロ:	ン(内服)の上	限(は1	00	mg	;/E	3															

(6コース目に初めて奏効が認められた場合は最大8コース目まで投与可)

48 . Epcoritamab【1コース目】

インターバル:4调 総コース数:1コース

									<u> </u>		1/1	•							446	_		<u> </u>	<u>终·</u>		_				
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	0.16mg/body																												
エプコリタマブ	0.8mg/body																												
	48mg/body																												
プレドニゾロン(注)※	100mg/body		1						/																				
プレドニゾロン(内服)※	100mg/body			abla													${\cal I}$	/	$\overline{\mathcal{I}}$					$\overline{\ \ }$		$\overline{\mathcal{I}}$			
カロナール(内服)※	1000mg/body								/																				
ポララミン(内服)※	2mg/body		1													/													
※エプキンリに	よるサイトカイン放	出	症	候	群(CF	RS)	を	軽.	減	さ さ さ	ナる	t:	め	投	与													

49 . Epcoritamab【2~3コース目】

インターバル:4週

総コース数:2コース

エプコリタマブ 48mg/body / /	
プレドニゾロン(注)※ 100mg/body /	
プレドニゾロン(内服)※ 100mg/body	

※前回エプコリタマブ投与後にGrade2又はGrade3のサイトカイン放出症候群(CRS)が現れた患者に対して エプコリタマブ投与後にGrade2以上のCRSが現れなくなるまで副腎皮質ホルモン剤の投与を行う。

50 . Epcoritamab【4~9コース目】

インターバル:4週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エプコリタマブ	48mg/body																												
プレドニゾロン(注)※	100mg/body																												
プレドニゾロン(内服)※	100mg/body			1/															$\overline{\mathcal{I}}$										

※前回エプコリタマブ投与後にGrade2又はGrade3のサイトカイン放出症候群(CRS)が現れた患者に対して エプコリタマブ投与後にGrade2以上のCRSが現れなくなるまで副腎皮質ホルモン剤の投与を行う。

51 . Epcoritamab【10コース目以降】

インターバル・4调

終コーマ数・担党だ!

								<u> </u>	_		·/ v	<u> </u>	יעכי						小心-			9 X ·	<i>八</i> 兀 /	<u> </u>	•				
薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エプコリタマブ	48mg/body																												
プレドニゾロン(注)※	100mg/body																												
プレドニゾロン(内服)※	100mg/body			\setminus																									

※前回エプコリタマブ投与後にGrade2又はGrade3のサイトカイン放出症候群(CRS)が現れた患者に対して エプコリタマブ投与後にGrade2以上のCRSが現れなくなるまで副腎皮質ホルモン剤の投与を行う。

52 . [BS]Ibrutinib+RB療法【1コース目】

インターバル・4调

終コース数・1コース

_										<u> </u>	<u>ノ</u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u>+ 火巴</u>	<u> </u>					中心	<u>. – </u>	<u> </u>	<u>へす</u>	<u>x </u>		-	_	
	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	リツキシマブ	375mg/ m ²																												
	ベンダムスチン	90mg/ m ²																												
I	イブルチニブ	560mg/日							7																					

53 . [BS]Ibrutinib+RB療法【RIT90分間投与】【2~6コース目】

インターバル:4週

総コース数:4コース

2~5コース目

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リツキシマブ	375mg∕ m i̇́																												
ベンダムスチン	90mg/ m ²																												
イブルチニブ	560mg/日														\setminus														

6コース目

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
リツキシマブ	375mg/ m ²																										
ベンダムスチン	90mg/ m ²																										
イブルチニブ	560mg/日	/							/				/	/			/			/		/					

54 . [BS]Ibrutinib+RB療法【RIT90分間投与】【7コース目以降】

インターバル:8週 総コース数:12コース

7~18コース目

薬剤名	投与量	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
リツキシマブ	375mg∕ m ੈ																									
イブルチニブ	560mg/日																									

インターバル:連日投与 総コース数:規定なし

19コース目以降

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	
イブルチニブ	560mg/日					/			