

血液内科 ALLレジメン

1 . JALSG ALL202-0 維持療法

インターバル: 4~8週毎

総コース数: 約2年間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビンクリスチン※	1.3mg/m ²	■																											
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	■	■	■	■	■																							
メトトレキサート(内服)	20mg/m ²	■							■								■							■					
メルカプトプリン(内服)	60mg/m ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ビンクリスチンの上限は2mg

2 . JALSG ALL202-0 寛解導入療法

インターバル: 規定なし

総コース数: 規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シクロホスファミド	1200mg/m ²	■																											
ダウノルビシン	60mg/m ²	■	■	■																									
ビンクリスチン※	1.3mg/m ²	■							■								■							■					
L-アスパラギナーゼ	3000K.U./m ²	■							■			■		■		■		■		■		■		■		■		■	
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ビンクリスチンの上限は2mg、注)60歳以上65歳未満は、GPAを800mg/m²、DNRを30mg/m²、プレドニン内服を7日間に減量

3 . JALSG ALL202-0 地固め療法①兼④

インターバル: 規定なし

総コース数: 規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■																									
シタラビン※	2000mg/m ² (1日2回投与)	■	■	■																									
エトポシド	100mg/m ²	■	■	■																									
メトトレキサート(髄注)	15mg/body	■																											
デキサメタゾン(髄注)	3.3mg/body	■																											

※ 60歳以上ではキロサイドを1000mg/m²に減量、Cre>2mg/dLではキロサイドを1000mg/m²に減量

4 . JALSG ALL202-0 地固め療法②兼⑤

インターバル: 規定なし

総コース数: 規定なし

薬剤名	投与量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビンクリスチン※1	1.3mg/m ²		■														■													
メトトレキサート※2	3000mg/m ²		■															■												
メルカプトプリン(内服)	25mg/m ²		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
メトトレキサート(髄注)	15mg/body		■															■												
デキサメタゾン(髄注)	3.3mg/body		■															■												
アセタゾラミド	250mg/回		■	■	■	■	■										■	■	■	■										
ホリナート	8~16A/回		■	■	■	■	■										■	■	■	■										

※1 ビンクリスチンの上限は2mg、※2 50歳以上では1500mg/m²に減量、Cre:1.5~2mg/dLでは25%減量、Cre≥2mg/dLでは中止

5 . JALSG ALL202-0 地固め療法③

インターバル:規定なし

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	16	17	18	19	20	21	22	...	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
デキサメタゾン(注)	10mg/m ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
ドキソルビシン	30mg/m ²	■							■																										
ビンクリスチン※	1.3mg/m ²	■							■																										
シクロホスファミド	1000mg/m ²																				■														
シタラビン	75mg/m ²																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
メルカプトプリン(内服)	60mg/m ²																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
メトトレキサート(髄注)	15mg/m ²	■																			■														
シタラビン(髄注)	40mg/body	■																			■														
デキサメタゾン(髄注)	3.3mg/body	■																			■														

※ビンクリスチンの上限は2mg

6 . weekly DVP療法

インターバル:規定なし

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ダウノルビシン	45mg/m ²	■							■								■						■												
ビンクリスチン※	1.3mg/m ²	■							■								■						■												
プレドニゾン(内服)	40~60mg/m ²	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ビンクリスチンの上限は2mg

7 . Hyper-CVAD/MA(Hyper-CVAD:1、3、5、7コース)

インターバル:規定なし

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
メスナ	600mg/m ²	■	■	■																			
シクロホスファミド	300mg/m ²	■	■	■																			
ドキソルビシン	50mg/m ²				■																		
ビンクリスチン※	1.3mg/m ²				■							■											
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■							■	■	■	■									
メトトレキサート(髄注)	12mg/body	■	■																				
シタラビン(髄注)	70mg/body								■														

※1ビンクリスチンの上限は2mg

8 . Hyper-CVAD/MA(大量MTX+Ara-C:2、4、6、8コース)

インターバル:規定なし

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
メトトレキサート	200mg/m ²	■																					
メトトレキサート	800mg/m ²	■																					
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注)	50mg/回	■	■	■																			
シタラビン※	2000mg/m ² (1日2回投与)	■	■	■																			
メトトレキサート(髄注)	12mg/body	■	■																				
シタラビン(髄注)	70mg/body								■														
ホリナート	5A/回	■	■	■																			

※ 60歳以上では1000mg/m²に減量中止